

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению ПоултриСтар® сол для регуляции баланса нормофлоры и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.

(организация-производитель: «Biomин GmbH» / «Биомин ГмбХ», Австрия)

### I. Общие сведения.

1. ПоултриСтар® сол (PoultryStar® sol) – кормовая добавка для регуляции баланса нормофлоры и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.

2. В состав ПоултриСтар® сол входят: смесь лиофилизированных пробиотических бактерий *Enterococcus faecium* (штамм DSM 21913) – не менее  $3.0 \times 10^{12}$  КОЕ/кг, *Bifidobacterium animalis* (штамм DSM 16284) – не менее  $1.5 \times 10^{12}$  КОЕ/кг, *Lactobacillus salivarius* (штамм DSM 16351) – не менее  $5.0 \times 10^{11}$  КОЕ/кг, – всего в количестве не менее 100 г/кг, наполнитель фруктоолигосахарид (инулин) до 1 кг.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. Представляет собой порошок белого цвета растворимый в воде.

4. Выпускают расфасованным в картонных коробках по 25 кг с полиэтиленовым мешком, алюминизированных пакетах по 100г, 200г, 300г, 500г, 600г и 1000г.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и торгового знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке завода-изготовителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 4 °С до 25°С.

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. ПоултриСтар® сол нельзя использовать по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства.

5. Пробиотические штаммы бактерий, входящие в состав ПоултриСтар® сол, отобраны из кишечника здоровых кур за их способность размножаться и колонизироваться в большей части длины кишечника и поддерживать здоровье птицы.

Фруктоолигосахарид (инулин) служит источником питательных веществ для полезной микрофлоры кишечника, в первую очередь бифидо- и лактобактерий, и, тем самым стимулирует их рост и синергически дополняет действие пробиотиков.

6. ПоултриСтар® сол обеспечивает развитие полезной микрофлоры кишечника у суточных цыплят и птицы всех возрастов и повышает устойчивость организма птицы к стрессам, способствует повышению продуктивности.

### III. Порядок применения

7. Добавку кормовую ПоултриСтар® сол применяют для регуляции баланса нормофлоры и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.

8. ПоултриСтар® сол применяют с водой для поения, используя существующие технологии поения.

- Прерывистое применение рекомендуется во время стрессовых периодов путем выпойки с питьевой водой в течение 3 дней, начиная с суточного возраста, и далее при каждой смене рациона. Норма ввода - 20 г/1000 голов в день.

- Непрерывное применение рекомендуется в качестве поддерживающего средства для улучшения баланса микрофлоры кишечника. Норма ввода: 2 г/1000 голов в день.

Маточный раствор готовится непосредственно перед применением путем медленного растворения 20 г кормовой добавки при постоянном перемешивании в 500 мл питьевой воды. Маточный раствор добавляется в воду для поения из расчета на 1000 голов в день. Маточный раствор необходимо использовать не позднее 2 часов после приготовления.

9. При применении добавки кормовой ПоултриСтар® сол в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено.

10. Противопоказаний к применению добавки кормовой ПоултриСтар® сол не установлено.

11. ПоултриСтар® сол совместим со всеми лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

12. Продукцию птицеводства после применения добавки кормовой ПоултриСтар® сол можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### IV. Меры личной профилактики

13. При работе с добавкой необходимо использовать средства индивидуальной защиты: противопылевые респираторы, перчатки и плотно прилегающие защитные очки. Необходима противопылевая вентиляция.

14. При попадании на кожу и в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством чистой воды. Загрязненные предметы одежды следует немедленно снять.

15. Добавку кормовую следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «Биомин» (г. Москва) совместно с фирмой "Biomин GmbH", Австрия.

(Адрес организации-производителя: "Biomин GmbH", Industriestrasse 21, 3130, Herzogenburg, Austria).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-12.14/04466